

WELLS KRITERIJI ZA DVT	OPIS	BOD
maligna bolest	Ako pacijent ima aktivni rak ili je u prestao s liječenjem unutar posljednjih 6 mjeseci ili je palijativni, dodaje se +1 bod.	
ležeći pacijent	Ako pacijent leži više od 3 dana ili je imao veliku operaciju unutar 12 tjedana, dodaje se +1 bod.	
oticanje lista	Ako je oticanje lista veće od 3 cm u usporedbi s drugom nogom (mjereno 10 cm ispod tuberoziteta tibije), dodaje se +1 bod.	
Kolat. površinske vene	Ako su prisutne kolateralne površinske vene (ne varikoziteti) dodaje se +1 bod.	
oteklina cijele noge	Ako je cijela noga otečena, dodaje se +1 bod.	
bolnost dubokih vena	Ako postoji lokalna bol uz duboki venski sustav, dodaje se +1 bod.	
tjestasti edem noge	Ako postoji tjestasti edem ograničen samo na zahvaćenu nogu, dodaje se +1.	
paraliza, pareza ili imobilizacija DE	Ako je prisutna paraliza, pareza ili je noga nedavno bila imobilizirana, dodaje se +1 bod.	
prethodna DVT	Ako je pacijent ranije imao dokumentiranu DVT, dodaje se +1 bod.	
alternativna dijagnoza	Ako postoji alternativna dijagnoza koja je vjerojatnija od DVT-a, oduzima se -2.	
ZBROJ BODOVA	Ukoliko je zbroj bodova <1 vjerojatnost za DVT je mala, ako je >2, velika je.	

Vjerojatnost
za DVT
<1 : mala
>2 : velika